

Alopecia como única manifestação da sífilis: um relato de caso

Natália Pierdoná¹
Nadya Cristina Gomes de Campos²
Marcielle Cordioli Deringer da Silva

1Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná, Brasil. 2-3. Prefeitura Municipal de Maringá- Secretaria da Saúde, Maringá, Paraná, Brasil *endereço para correspondência. E-mail: nataliapierdona.uem@gmail.com

Introdução

Queda de cabelo é uma queixa freqüente na Atenção Primária à Saúde. Realizar o diagnóstico diferencial adequado, muitas vezes é desafiador.

Objetivos

Descrever um caso de queda de cabelo como manifestação única de sífilis secundária.

Metodologia

D.S.T., mulher, 17 anos, iniciou com episódio de queda de cabelo difusa há cerca de 1 mês. Concomitante, apresentava episódio depressivo com desânimo e anedonia. Passou por estresse recente com término de relacionamento amoroso e mudança de cidade. Nega tabagismo ou outras comorbidades. Prescrita na primeira consulta fluoxetina 20mg e Minoxidil tópico 5% para aplicar no couro cabeludo 1 vez ao dia. Retorna em consulta após 2 meses (3 meses após início da queda de cabelo), referindo que não iniciou fluoxetina, mas manteve uso de Minoxidil tópico, com progressão da queda de cabelo, evoluindo para a formação de placas.

Resultados

Ao exame físico, presença de placas de alopecia de cerca de até 3 cm de diâmetro, difusas em região de couro cabeludo, predominantes em região parietal, com pelos cadavéricos e em exclamação, além de teste de tração positivo. Trouxe resultado de VDRL, positivo 1:64. Negava outros sintomas de infecção. Feito tratamento considerando sífilis secundária e tratada com penicilina benzatina 1.200.000 UI em cada glúteo, dose única. Em retorno no mês seguinte, percebeu melhora do quadro, com parada da progressão da alopecia. Não retornou à consulta posteriormente.

Conclusão

Sífilis é uma doença infecciosa caracterizada por três estágios clínicos: primária (lesões genitais), secundária (lesões palmoplantares entre outras) e terciária (acometimento neurológico, cardiovascular entre outros). Pesquisar sífilis faz parte do diagnóstico diferencial de queda de cabelo. A alopecia sífilítica (AS) é uma manifestação menos comum da sífilis, e pode ocorrer apenas com queda capilar, sem outras manifestações na pele, como foi o caso dessa paciente. O principal diagnóstico diferencial da AS é a alopecia areata.

Palavras-chave: Alopecia, sífilis, atenção primária à saúde.



Referências

- 1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. TelessaúdeRS-UFRGS. TeleCondutas: Sífilis. 3. ed. Porto Alegre: TelessaúdeRS-UFRGS; 2023 30 nov. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/telessauders/materiais-teleconduta/>.
- 2 Schultz Junior, A.; Rocha, L. F.; Sassine, I, Z.; Correia, M. A. Alopecia sífilítica difusa essencial. Revista Científica da FMC. 2020; 15(3).
- 3 Bomfim, I. C. C.; Ianhez, M.; Miot, H. A. Achados dermatoscópicos da alopecia sífilítica. Anais Brasileiros de Dermatologia. 2020; 95: 518-20,

