

Barreiras invisíveis: a amputação como resultado da não utilização oportuna dos serviços de saúde

Heloísa Tello Mafrá¹
João Pedro Pedroni de Souza²
Juliana Gomes Margraf³
Márcio Peixoto Rocha da Silva⁴
Milena Martinez Camargo⁵
Simone Kempf Stachechem⁶

1-6 Universidade do Contestado, Mafrá, Santa Catarina, Brasil *endereço para correspondência. E-mail: heloisatellomafrá@gmail.com

Introdução

A milase é uma infecção parasitária causada por larvas de moscas que afeta tecidos vivos ou necrótico. Quando ignorada, essa infecção pode levar a complicações graves, como amputação. O acesso rápido à atenção primária é crucial para o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz. No entanto, o acesso é um dos princípios da Atenção Primária à Saúde (APS) com pior avaliação no Brasil. Este trabalho discute a importância do acesso facilitado à atenção primária e a responsabilidade dos pacientes em buscar atendimento oportunamente para prevenir desfechos graves.

Objetivos

Enfatizar a importância do acesso facilitado à atenção primária e a necessidade de que os pacientes busquem os serviços de saúde oportunamente para prevenir complicações graves, como a amputação.

Metodologia

Estudo baseado em um relato de caso de um homem com milase, atendido em uma unidade de saúde rural em Santa Catarina.

Resultados

Homem de 64 anos, tabagista, procurou tardiamente a equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) com queixas de dor no hálux do pé direito. Ao exame, foram observadas várias infecções por milase, com um grande abscesso e sinais de cianose distal no hálux. O paciente foi encaminhado ao serviço de urgência, que o referenciou para a atenção secundária, onde foi realizada a amputação parcial do pé. Sem registros frequentes na unidade, o paciente recebia visitas mensais do agente comunitário, mas nunca relatou o problema, buscando ajuda apenas devido à dor intensa.

Conclusão

O caso destaca a importância do acesso facilitado à atenção primária e a necessidade de educação em saúde para que os pacientes compreendam a importância de buscar atendimento precocemente. A falta de percepção da gravidade, aliada à busca tardia por cuidados, resultou em um desfecho grave que poderia ter sido evitado com intervenção precoce.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Acesso aos Serviços de Saúde; Miíase.



Referências

Francesconi, F, Lupi, O. Myiasis. Clinical microbiology reviews. 2012; 25(1): 79–105. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1128/cmr.00010-11>.

Khanassov, V, Pluye,P, Descoteaux,S, Haggerty, JL, Russell,G, Gunn,J, Levesque,Jean-Frederic. Organizational interventions improving access to community-based primary health care for vulnerable populations: a scoping review. International journal for equity in health. 2016; 15(1). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1186/s12939-016-0459-9>

Pinto, LF, Giovanella, L. Do Programa à Estratégia Saúde da Família: expansão do acesso e redução das internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB). Ciencia & saude coletiva. 2018; 23(6): 1903–1914. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018236.05592018>.